

ソフトエチル系国産ブラックグレー



まつ連基準適合品

- 持続性 ★★★★★ → 約1ヵ月～1.5ヵ月（施術方法やアフターケアにより異なる）
速乾性 ★★★★★ → 超速乾。硬化速度約1～2秒
粘度 ★★☆☆☆ → さらさらとした使用感
揮発性 ★★★☆☆ → 若干の刺激アリ
色 ★★★★★ → かなり黒い、ディープブラック色

〈特徴〉

- ★オイルクレンジング使用可能
- ★施術後（完全硬化後）の行動（メイク・洗顔・プール・サウナ）制限なし
- ★微粒子カーボン使用
- ★ラテックス（天然ゴム）不使用
- ★原材料・商材部品の全てが日本製
- ★サロン技術者とグレー専門工場との共同開発

ご使用方法

【使用環境】

- 温度調節：常温（25度程度）が望ましく、冷蔵庫保管のグレーを使用する際は必ず常温に戻し使用します
(グレー外装に触れてひんやりとしている場合は、常温に戻っていません)
常温に戻さずに使用するとシアノアクリレート本来の性能が発揮できません
 - ・グレーがドロドロしている場合
《原因》グレー保管温度が高すぎます
《対処方法》劣化しているため破棄が望ましい
再冷却を行なっても本来の接着強度には戻りません
 - ・グレーがさらさらしている場合
《原因》グレー保管温度が低すぎます
《対処方法》常温に戻して使用すると、本来の接着強度に戻ります
- 湿度・水分量調節：40%～60%が望ましい
涙目・クレンジング後の方はしっかりと水分を除去後、使用します
水分量の多い箇所・湿度の高い時期（場所）で使用した場合は、白化現象が起こることがあります
*白化現象とは…グレーが硬化する際に揮発する成分が水分と過剰に反応し、使用箇所が白化する現象
白化現象が起ってもグレーの持続性・強度に変わりはございません

【ご使用前】

- 初開封の際は、同封の開封用ピンをボトル先端に刺し、開栓します
- 20回程度振り、成分を混ぜ合わせてから使用します
- ※しっかり振らずに使用すると成分が混ざり合わず、本来の性能を発揮できないため、エクステンションの付き・持続性が悪くなります

【ご使用後】

- ノズルについたグレーをきれいに拭き取り、キャップ内部のグレーは綿棒で拭き取る
※きれいに拭き取りを行なわないと、キャップの開閉ができなくなります
- ※ノズルの拭き取りにはティッシュペーパーやコットンのご使用はお避けください
毛羽立った繊維が張り付き、キャップが閉まりにくくなる原因となります

【開閉時注意事項】

- ※ノズル・キャップを完全に閉めていないとチューブ内に空気が入り、グレーの劣化が早くなります
- ※グレーが溢れた際はキャップを閉めても、中で溢れ続けててしまいます
溢れたグレーが止まるまでお待ちいただき、ノズルをしっかりと拭いてから閉めてください
- ※グレーが出ない際は中に入っている玉が詰まっている可能性がございますので、安全ピンのような細いもので、中に落としてご使用ください

【保管】

- 温度調節：開封前…冷蔵庫保管が望ましい
開封後…常温（25度程度）が望ましい
- 状態：アルミパックに立てて入れ、アルミパックも立てて保管します
横・逆さの状態で保管するとキャップ内部でグレーが逆流し、蓋が開かなくなることがあります
(アルミパックが光を遮断し、光吸収によるグレー劣化を最小限に抑え、
同封のシリカゲル（乾燥剤）が水分結合によるグレー劣化を最小限に抑えます)
- 期限：開封前…外装アルミパックに記載（6ヵ月以内）
開封後…1ヵ月以内
使用環境・保管状態により期限は前後します
開封後、使用期間内であっても粘りが出てきた場合は交換時期です

【使用上の注意】

- アレルギー体质の方や肌の弱い方、傷・かぶれのある近くには使用しないでください
(アレルギーの有無は過去のトラブル有無を確認し、パッチテストをお勧めください)
- グルーアレルギーが出た場合は、直ちにまづげエクステンションを除去（リムーブ）し、医師の診断を受けてください
- 万が一、目に入った場合は、目をこすらず精製水で繰り返し洗浄し、直ちに医師の診断を受けてください
リムーバー・アセトン溶剤は絶対に使用しないでください
- 直接、皮膚には付かないようにしてください
皮膚に付着した場合は無理にはがさず、お湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください
- 使用中は換気を行い、気分が悪くなるなどの異常を感じた場合は新鮮な空気の場所に移り安静にしてください
- 引火性であるため、火気にご注意ください
- 布などしみこみやすいものに多量に付着した際は急速に反応し発熱します
皮膚に接着・隣接した箇所の場合は火傷にご注意ください
- 幼児の手の届かないようにして、いたずらに注意してください
- 万が一、誤飲した場合は、直ちに医師の診断を受けてください

【アレルギー反応とパッチテストについて】

施術前、お客様に過去の薬剤などによるアレルギー反応の有無をご確認・事前にパッチテストをご案内されますことをお勧めいたします。
パッチテストはまづげエクステンションを数本付け数時間～1日程度様子をみていただき、変化がない場合に、
グレーを使用されることをお勧めいたします。
なお、パッチテストで問題がない方も施術中・施術後にアレルギー反応がでる場合もございます。
その際は、直ちにまづげエクステンションを除去（リムーブ）し医師の診断を受けてください。

株式会社 kichi omeエンタープライズ

まづげエクステンション商材の企画・開発・卸

T E L. 0120-965-583 06-6252-3773
F A X. 06-6252-3774
E-mail. info@ome-shouzai.com
online shop. <http://www.ome-shouzai.com>